

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie dot. stwierdzonego pierwszego przypadku rzekomego pomoru drobiu - choroba Newcastle na terenie powiatu jędrzejowskiego



POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, że w dniu 29.01.2025r. na terenie powiatu jędrzejowskiego został stwierdzony pierwszy przypadek rzekomego pomoru drobiu - choroba Newcastle. Zakażenie wystąpiło na terenie gminy Sędziszów, w miejscowości Piołunka w gospodarstwie drobiu - chów przyzagrodowy.

Objawy rzekomego pomoru drobiu (ND):

Rzekomy pomór drobiu (ND - Newcastle Disease) może przebiegać z bardzo dużą śmiertelnością, w przeciągu 3-4 dni od wystąpienia objawów klinicznych. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób układu oddechowego, na którą narażone są ptaki w każdym wieku - zarówno hodowlane jak i dzikie. Śmiertelność u zakażonych zwierząt może dochodzić nawet do 100%.

Typowe objawy kliniczne rzekomego pomoru drobiu:

- sapanie, kaszel, kichanie i rzężenie
- biegunka (często zielonkawa).
- drżenia mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, nienaturalnie skręcona szyja (torticollis);
- Produkcja nieśna spada od 30 do 50% lub więcej i powraca do normy po około 2 tygodniach. Jaja mogą mieć cienką skorupę, typowe jest również składanie jaj bez skorup (tzw. „łanie jaj” - jaj w błonach).

Rzekomy Pomór Drobiu - Choroba Newcastle przenoszona jest drogą kropelkową. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z wydzieliną zapalną, np. podczas korzystania z jednego poidła lub karmnika, do którego dostęp miało zakażone zwierzę. Odchody chorych ptaków zawierające wirus zanieczyszczają paszę, wodę i otoczenie, stanowiąc źródło zakażenia. Wirus rzekomego pomoru drobiu wykazuje dużą przeżywalność w środowisku (zwłaszcza w kałomoczu),

nawet przez okres kilku tygodni. Okres inkubacji choroby trwa od 2 do 15 dni (średnio 5-6 dni).

Posiadacz drobiu, jak również lekarz weterynarii opiekujący się stadem, powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- Zwiększona śmiertelność;
- Znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- Objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu;
- Dusznosc;
- Sinica i wybroczyny;
- Nagły spadek nieśności.

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu

• Rzekomy pomór drobiu nie podlega leczeniu. Jest to choroba zwalczana z urzędu. Następuje likwidacja stada oraz jego utylizacja. Należy wówczas usunąć wszystkie przedmioty, z którymi ptaki miały kontakt oraz wykonać dokładną dezynfekcję pomieszczeń oraz urządzeń.